

File No#: 1000123 Date: 21/17  
اسم المريض: \_\_\_\_\_  
Patient Name: Reem Ghad Alkhatib  
Date of Birth (تاريخ الميلاد): \_\_\_\_\_ Gender (الجنس): M / F  
Nationality (الجنسية): Palestinian Occupation (الوظيفة): \_\_\_\_\_  
Marital Status (الحالة الاجتماعية): \_\_\_\_\_ Phone No. (رقم الهاتف): \_\_\_\_\_  
Contact Person in Case of Emergency: \_\_\_\_\_

How Did You Know About Us?

Instagram

### التاريخ الطبي للعلاج بالليزر

\*يرجى الاجابة على الأسئلة التالية بدقة:-

- 1- ما هو الوصف الأنسب لنوع بشرتك ؟  
1 - دائمة الاحتراق , قليلة الاسمرار  
2- دائمة الاحتراق , عديمة الاسمرار  
3 - قليلة الاحتراق , دائمة الاسمرار  
4- نادرة الاحتراق , دائمة الاسمرار  
5- بشرة داكنة السمرة

2- هل ظهرت لديك سابقا علامات ندوب أو جدره ؟ نعم \_\_\_ لا \_\_\_

3- هل لديك اي تاريخ مرضي من الحلا البسيط (الهربس) أو بثور الحمى أو التقرحات في منطقة العلاج ؟ نعم \_\_\_ لا \_\_\_

4- هل تناولت عقار "الأكيوتان" / الايسوترتينونين " خلال الست أشهر الماضية؟ نعم \_\_\_ لا \_\_\_

## إقرار للعلاج باستخدام جهاز Q-Switch Laser

أقر أنا \_\_\_\_\_ بتفويض طبيب الاختصاص أو أحد معاونيه لإجراء العلاج باستخدام جهاز ليزر ال Q-Switch

■ التقشير الكريوني باستخدام لوشن الكريونو يتبعه التقشير بالليزر هو احد الإستطبات لإعادة نضارة البشرة, وعلاج علامات التقدم بالسن, علاج التجاعيد, خطوط الوجه والشذوذ الصبغي (البقع الحمراء والبنية غير المرغوب بها والمرتبطة بالتقدم بالسن وحالات أخرى), تحسين ملمس البشرة, علاج حب الشباب, إحصار الجلد, إزالة التصبغات(البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب), الندوب التي تتبع الحبوب, توسع مسامات الجلد, إزالة أو تخفيف الشعر الناعم بشكل مؤقت. بشكل عام ينصح 3-5 جلسات معظمهم فترة زمنية من 2-4 اسابيع وجلسات مراجعة كل 3-6 اشهر.

■ التقشير الناعم وإزالة التصبغات بالليزر يقوم الجهاز بالتقشير بدون استخدام لوشن الكريون, بينما التقشير الناعم هو إزالة التصبغات بالليزر بإضافة لوشن الكريون مما يستهدف الأصباغ الأكثر عمقا الشائعة في الكلف و زيادة التصبغات بعد الإنتهاء. ينصح ب6-12 جلسة بينهم 3-6 اشهر خصوصا في حالة الكلف.

. إزالة الوشم بالليزر.

. الأورام الصبغية.

. تشقير الشعر.

. إزالة فطريات الاضافر(الوضع A)

. بئر إزالة الكلف (الوضع M)

مضادات الإستعمال للعلاج يتضمن:

. تناول عقار الأيسوترتينوين (الأكيو تان) خلال ال6 اشهر الماضية.

. الحمل والرضاعة.

